

Zuza Wiśniewska

opis produktu

kategoria: medycyna

Paracetamol 500 mg x 20 tabletek (Aflofarm)

Paracetamol to powszechnie stosowany środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Substancja czynna stosowana jest w leczeniu krótkotrwałych bólów o niskim lub średnim natężeniu. Paracetamol może być stosowany w przypadku bólu głowy, mięśni, stawów czy brzucha, a także w przypadku bóli miesiączkowych i tych powiązanych z operacją, zabiegiem stomatologicznym czy urazem. Składnik sprawdza się również dobrze w uśmierzaniu nerwobóli oraz w zbijaniu gorączki.

Substancja czynna doskonale wchłania się do przewodu pokarmowego, co powoduje szybkie poczucie ulgi. Jednocześnie, paracetamol nie oddziałuje na proces krzepnięcia krwi, co ma znaczenie w terapii wszelkiego rodzaju urazów. Lek bezpieczny dla żołądka jest metabolizowany w wątrobie i wydalany wraz z moczem.

Składniki

Jedna tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu (*Paracetamolum*).

Wskazania i działanie

Paracetamol jest substancją, znajdującą zastosowanie w krótkotrwałym leczeniu bólu o małym i średnim nasileniu. Składnik może być wykorzystywany celem niwelowania bólu głowy, mięśni, zębów, a także bóli miesiączkowych, układu kostno-stawowego czy bólu po zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych. Z uwagi na właściwości zbijania gorączki, paracetamol może również uzupełniać proces leczenia przeziębienia lub grypy.

Substancja czynna wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Cechy te są powiązane z tym, że paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w centralnym układzie nerwowym. To one oddziałują na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu, podwyższając temperaturę ciała w czasie choroby. Paracetamol działa przeciwbólowo ze względu na oddziaływanie ośrodkowe oraz redukcji wrażliwości receptorów bólowych. Efekt zażycia substancji czynnej powinien przynieść ulgę po 30-60 minut od zażycia.

Dawkowanie

Dawkowanie paracetamolu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją załączoną w ulotce lub na podstawie zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: stosować jednorazowo od 1 do 2 tabletek (500-1000 mg substancji czynnej). W razie potrzeby dawkę można zwiększyć po co najmniej 4 godzinach od podania poprzedniej. Nie stosować częściej niż 4 razy na dobę. Zwyczajowo powinno się stosować jedną tabletkę 4 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dzieci od 6. do 12. roku życia: stosować jednorazowo pół tabletki (250 substancji czynnej). W razie potrzeby dawkę można zwiększyć po co najmniej 4 godzinach od podania poprzedniej. Nie stosować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Przeciwwskazania

Paracetamol nie powinien być stosowany u osób z nadwrażliwością lub alergią na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest ciężka niewydolność nerek i wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, a także wiek poniżej 6 lat. Chcąc stosować paracetamol w okresie ciąży i laktacji należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować paracetamolu u pacjentów z niedoborem G-6-PD oraz reduktazy methemoglobiny.

Działania niepożądane

Występujące rzadko:

- pokrzywka,
- rumień,
- wysypka,
- nudności,
- wymioty,
- bóle brzucha,
- zaburzenia trawienia.

Występujące bardzo rzadko:

- obrzęk naczynioruchowy w obrębie twarzy lub jamy ustnej,
- wstrząs anafilaktyczny,
- zawroty głowy,
- zaburzenia świadomości,
- przyspieszona akcja serca,
- ciężkie reakcje skórne,
- ostre uszkodzenie wątroby,
- plamica barwnikowa,
- trombocytopenia (obniżenie liczby płytek krwi),
- agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów).